Synflorix™

DESCRIPTION

Synflorix™ suspension for injection

Pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (adsorbed)

One dose (0.5 ml) contains 1 microgram of polysaccharide for serotypes [1,2] 1, 5, 6B, 7F, 9V, 14 and 23F, and 3 micrograms of polysaccharide for serotypes 4, 18C and 19F, each:

[3] adsorbed on aluminium phosphate	0.5 milligram Al3+
[4] conjugated to protein D (derived from non-typeable *Haemophilus influenzae*) carrier protein	9-16 micrograms
[5] conjugated to tetanus toxoid carrier protein	5-10 micrograms
[6] conjugated to diphtheria toxoid carrier protein	3-6 micrograms

Excipients: sodium chloride, 2-phenoxyethanol (5 milligrams), water for injections

ADMINISTRATION

Synflorix™ is for intramuscular injection. The preferred sites are anterolateral aspect of the thigh in infants or the deltoid muscle of the upper arm in young children (see also sections Immunization Schedule and Precautions).

Synflorix™ is a turbid white suspension. A fine white deposit with a clear colourless supernatant may be observed upon storage of the vial. This does not constitute a sign of deterioration.

The content of the vial should be inspected visually both before and after shaking for any foreign particulate matter and/or abnormal physical appearance prior to administration.

In the event of either being observed, discard the vaccine.

The vaccine should be allowed to reach room temperature before use.

The vaccine should be well shaken before use.

Once opened, multidose vial should be kept in a refrigerator (2°C – 8°C).

The 4-dose vial of ***Synflorix™*** from which one or more doses of vaccine have been removed during an immunization session may be used in subsequent immunization sessions for up to a maximum of 28 days, provided that all of the following conditions are met (as described in the WHO policy statement: the use of opened multidose vials in subsequent immunization sessions. WHO/IVB/00.09):

- The expiry date has not passed;
- The vaccines are stored under appropriate cold chain conditions;
- The vaccine vial septum has not been submerged in water;
- Aseptic technique has been used to withdraw all doses;
- The vaccine vial monitor (VVM), if attached, has not reached the discard point.

Any unused product or waste material should be disposed of in accordance with local requirements.

IMMUNIZATION SCHEDULE

Active immunization against invasive disease, pneumonia and acute otitis media caused by *Streptococcus pneumoniae* in infants and children from 6 weeks up to 5 years of age. See sections Precautions and Pharmacological properties for information on protection against specific pneumococcal serotypes.

The use of ***Synflorix™*** should be determined on the basis of official recommendations taking into consideration the impact on pneumococcal diseases in different age groups as well as the variability of the epidemiology in different geographical areas.

Vaccination schedule

Infants from 6 weeks to 6 months of age

Three-dose primary series

The recommended immunization series to ensure optimal protection consists of four doses, each of 0.5 ml. The primary infant series consists of three doses with the first dose usually given at 2 months of age and with an interval of at least 1 month between doses. The first dose may be given as early as 6 weeks of age. A booster (fourth) dose is recommended at least 6 months after the last primary dose and may be given from the age of 9 months onwards (preferably between 12 and 15 months of age) (see sections Precautions and Pharmacological properties)

Two-dose primary series

Alternatively, when ***Synflorix™*** is given as part of a routine infant immunization programme, a series consisting of three doses, each of 0.5 ml may be given. The first dose may be given as early as 6 weeks of age, with a second dose administered 2 months later. A booster (third) dose is recommended at least 6 months after the last primary dose and may be given from the age of 9 months onwards (preferably between 12 and 15 months of age) (see section Pharmacological properties).

Unvaccinated infants and children > 7 months of age

- infants aged 7-11 months: The vaccination schedule consists of two primary doses of 0.5 ml with an interval of at least 1 month between doses. A booster (third) dose is recommended in the second year of life with an interval of at least 2 months after the last primary dose.
- children aged 12 months - 5 years: The vaccination schedule consists of two doses of 0.5 ml with an interval of at least 2 months between doses.

Official recommendations should be taken into account when immunizing with ***Synflorix™*** (for preterm infants see sections Side effects and Pharmacological properties).

It is recommended that subjects who receive a first dose of ***Synflorix™*** complete the full vaccination course with ***Synflorix™***.

Special populations

In individuals who have underlying conditions predisposing them to invasive pneumococcal disease (such as sickle cell disease (SCD) or Human Immunodeficiency Virus (HIV) infection) ***Synflorix™*** may be given (see sections Precautions and Pharmacological properties):

- in infants as described under "Three-dose primary series" above.
- in unvaccinated children > 7 months of age and under 2 years of age as described under "Unvaccinated infants and children ≥ 7 months of age" above.

Paediatric population

The safety and efficacy of ***Synflorix™*** in children over 5 years of age have not been established.

Use with other vaccines

Synflorix™ can be given concomitantly with any of the following monovalent or combination vaccines (including DTPa-HBV-IPV/Hib and DTPw-HBV/Hib): diphtheria-tetanus-acellular pertussis vaccine (DTPa), hepatitis B vaccine (HBV), inactivated polio vaccine (IPV), *Haemophilus influenzae* type b vaccine (Hib), diphtheria-tetanus-whole cell pertussis vaccine (DTPw), measles-mumps-rubella vaccine (MMR), varicella vaccine (V), meningococcal serogroup C conjugate vaccine (CRM_{197} and TT conjugated), meningococcal serogroups A, C, W-135 and Y conjugate vaccine (TT conjugate), oral polio vaccine (OPV) and oral rotavirus vaccine. Different injectable vaccines should always be given at different injections sites.

Clinical studies demonstrated that the immune responses and the safety profiles of the co-administered vaccines were unaffected, with the exception of the inactivated poliovirus type 2 response, for which inconsistent results were observed across studies (seroprotection ranging from 79% to 100%). In addition when the meningococcal serogroups A, C, W-135 and Y vaccine (TT conjugate) was co-administered with a booster dose of ***Synflorix™*** during the second year of life in children primed with 3 doses of ***Synflorix™*** lower antibody geometric mean concentration (GMC) and opsonophagocytic assay geometric mean titre (OPA GMT) were observed for one pneumococcal serotype (18 C). There was no impact of co-administration on the other nine pneumococcal serotypes. Enhancement of antibody response to Hib-TT conjugate, diphtheria and tetanus antigens was observed. The clinical relevance of the above observations is unknown.

Use with systemic immunosuppressive medicinal products

As with other vaccines it may be expected that in patients receiving immunosuppressive treatment an adequate response may not be elicited.

Use with prophylactic administration of antipyretics

See section Precautions.

SIDE EFFECTS

Summary of the safety profile

Safety assessment of ***Synflorix™*** was based on clinical trials involving the administration of 63,905 doses of ***Synflorix™*** to 22,429 healthy children and 137 preterm infants as primary vaccination. Furthermore, 19,466 children and 116 preterm infants received a booster dose of ***Synflorix™*** in the second year of life. Safety was also assessed in 435 previously unvaccinated children from 2 to 5 years old of which 285 subjects received 2 doses of ***Synflorix™***.

In all trials, ***Synflorix™*** was administered concurrently with the recommended childhood vaccines.

In infants, the most common adverse reactions observed after primary vaccination were redness at the injection site and irritability which occurred after approximately 41% and 55% of all doses respectively. Following booster vaccination, the most common adverse reactions were pain at the injection site and irritability, which occurred at approximately 51% and 53% respectively. The majority of these reactions were of mild to moderate severity and were not long lasting.

No increase in the incidence or severity of the adverse reactions was seen with subsequent doses of the primary vaccination series.

Local reactogenicity of primary vaccination course was similar in infants < 12 months of age and in children > 12 months of age except for injection site pain for which the incidence increased with increasing age: pain was reported by more than 39% of the infants < 12 months of age and by more than 58% of the children > 12 months of age.

Following booster vaccination, children > 12 months of age are more likely to experience injection site reactions compared to the rates observed in infants during the primary series with ***Synflorix™***.

Following catch-up vaccination in children 12 to 23 months of age, urticaria was reported more frequently (uncommon) compared to the rates observed in infants during primary and booster vaccination.

Reactogenicity was higher in children receiving whole cell pertussis vaccines concomitantly. In a clinical study children received either ***Synflorix™*** (N=603) or 7-valent Prevenar (N=203) concomitantly with a DTPw vaccine combination. After the primary vaccination course, fever ≥38°C and >39°C was reported respectively in 86.1% and 14.7% of children receiving ***Synflorix™*** and in 82.8% and 11.6% of children vaccinated with 7-valent Prevenar.

In comparative clinical studies, the incidence of local and general adverse events reported within 4 days after each vaccination dose was within the same range as after vaccination with 7-valent Prevenar.

Tabulated list of adverse reactions

Adverse reactions (for all age groups) considered as being at least possibly related to vaccination have been categorised by frequency.

Frequencies are reported as:

Very common:	(≥ 1/10)
Common:	(≥1/100 to <1/10)
Uncommon:	(≥1/1,000 to <1/100)
Rare:	(≥1/10,000 to <1/1,000)
Very rare:	(<1/10,000)

System Organ Class	Frequency	Adverse reactions
Clinical trials		
Immune system disorders	Rare	Allergic reactions (such as allergic dermatitis, atopic dermatitis, eczema)
	Very rare	Angioedema
Metabolism and nutrition disorders	Very common	Appetite lost
Psychiatric disorders	Very common	Irritability
	Uncommon	Crying abnormal
Nervous system disorders	Very common	Drowsiness
	Rare	Convulsions (including febrile convulsions)
Vascular disorders	Very rare	Kawasaki disease
Respiratory, thoracic and mediastinal disorders	Uncommon	Apnoea in very premature infants (≤28 weeks of gestation) (see section Precautions)
Gastrointestinal disorders	Uncommon	Diarrhoea, vomiting
Skin and subcutaneous tissue disorders	Uncommon	Rash
	Rare	Urticaria
General disorders and administration site conditions	Very common	Pain, redness, swelling at the injection site, fever ≥ 38°C rectally (age < 2 years)
	Common	Pain, redness, swelling at the injection site, fever ≥ 39°C rectally (age < 2 years)
	Common	Injection site reactions like injection site induration, fever >39°C rectally (age < 2 years)
	Uncommon	Injection site reactions like injection site haematoma, haemorrhage and nodule
Adverse reactions additionally reported after booster vaccination of primary series and/or catch-up vaccination:		
Nervous system disorders	Uncommon	Headache (age 2 to 5 years)
Gastrointestinal disorders	Uncommon	Nausea (age 2 to 5 years)
General disorders and administration site conditions	Common	Fever ≥38°C rectally (age 2 to 5 years)
	Uncommon	Injection site reactions like pruritus, fever > 40°C rectally (age < 2 years), fever >39°C rectally (age 2 to 5 years), diffuse swelling of the injected limb, sometimes involving the adjacent joint
Post-marketing experience		
Immune system disorders	Very rare	Anaphylaxis
Nervous system disorders	Rare	Hypotonic-hyporesponsive episode

Special populations

Safety of ***Synflorix™*** was assessed in 83 HIV positive (HIV+/+) infants (asymptomatic or with mild symptoms according to WHO classification), 101 HIV negative infants born from HIV positive mothers (HIV+/-) and 50 infants with sickle cell disease (SCD), receiving primary vaccination. Of these, 76, 96 and 49 infants, respectively, received a booster dose. Safety of ***Synflorix™*** was also assessed in 50 children with SCD starting vaccination at 7-11 months of age, all of them receiving the booster vaccination, and in 50 children with SCD starting vaccination at 12-23 months of age. Results suggest comparable reactogenicity and safety profile of ***Synflorix™*** between these high risk groups and healthy children.

CONTRAINDICATIONS

Synflorix™ should not be administered to subjects with known hypersensitivity to any component of the vaccine (see section Description).

As with other vaccines, the administration of ***Synflorix™*** should be postponed in subjects suffering from acute severe febrile illness. However, the presence of a minor infection, such as a cold, should not result in the deferral of vaccination.

PRECAUTIONS

It is good clinical practice to precede vaccination by a review of the medical history (especially with regard to previous vaccination and possible occurrence of undesirable events) and a clinical examination.

As with all injectable vaccines, appropriate medical treatment and supervision should always be readily available in case of a rare anaphylactic reaction following the administration of the vaccine.

The potential risk of apnoea and the need for respiratory monitoring for 48-72h should be considered when administering the primary immunization series to very premature infants (born ≤ 28 weeks of gestation) and particularly for those with a previous history of respiratory immaturity. As the benefit of vaccination is high in this group of infants, vaccination should not be withheld or delayed.

Synflorix™ should under no circumstances be administered intravascularly or intradermally. No data are available on subcutaneous administration of ***Synflorix™***.

In children up to 2 years of age, syncope (fainting) can occur following, or even before, any vaccination as a psychogenic response to the needle injection. It is important that procedures are in place to avoid injury from faints.

As for other vaccines, delayed immune responses to ***Synflorix™*** should be given with caution to individuals with thrombocytopenia or any coagulation disorder since bleeding may occur following an intramuscular administration to these subjects.

Official recommendations for the immunization against diphtheria, tetanus and *Haemophilus influenzae* type b should also be followed.

There is insufficient evidence that ***Synflorix™*** provides protection against pneumococcal serotypes not contained in the vaccine except the cross-reactive serotype 19A (see section Pharmacological properties) or against non-typeable *Haemophilus influenzae*. ***Synflorix™*** does not provide protection against other micro-organisms.

As with any vaccine, ***Synflorix™*** may not protect all vaccinated individuals against invasive pneumococcal disease, pneumonia or otitis media caused by the serotypes in the vaccine and the cross-reactive serotype 19A. In addition, as otitis media and pneumonia are caused by many micro-organisms other than the *Streptococcus pneumoniae* serotypes represented by the vaccine, the overall protection against these diseases is expected to be limited and substantially lower than protection against invasive disease caused by the serotypes in the vaccine and serotype 19A (see section Pharmacological properties).

In clinical trials, ***Synflorix™*** elicited an immune response to all ten serotypes included in the vaccine, but the magnitude of the responses varied between serotypes. The functional immune response to serotypes 1 and 5 was lower in magnitude than the response against all other vaccine serotypes. It is not known whether this lower functional immune response against serotypes 1 and 5 will result in lower protective efficacy against invasive disease, pneumonia or otitis media caused by these serotypes (see section Pharmacological properties).

Synflorix™ indicated for use in children aged from 6 weeks up to 5 years. Children should receive the dose regimen of ***Synflorix™*** that is appropriate to their age at the time of commencing the vaccination series (see section Immunization Schedule). Safety and immunogenicity data are not yet available in children above 5 years of age.

Children with impaired immune responsiveness, whether due to the use of immunosuppressive therapy, a genetic defect, HIV infection, prenatal exposure to anti-retroviral therapy and/or to HIV, or other causes, may have reduced antibody response to vaccination.

Safety and immunogenicity data are available for HIV infected infants (asymptomatic or with mild symptoms according to WHO classification), HIV negative infants born from HIV positive mothers and children with sickle cell disease (see sections Side effects and Pharmacological properties). Safety and immunogenicity data for ***Synflorix™*** are not available for individuals in other specific immunocompromised groups and vaccination should be considered on an individual basis (see section Immunization Schedule).

Children younger than 2 years old should receive the appropriate-for-age ***Synflorix™*** vaccination series (see section Immunization Schedule). The use of pneumococcal conjugate vaccine does not replace the use of 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine in children ≥ 2 years of age with conditions (such as sickle cell disease, asplenia, HIV infection, chronic illness, or those who have other immunocompromising conditions) placing them at higher risk for invasive disease due to *Streptococcus pneumoniae*. Whenever recommended, children at risk who are ≥ 24 months of age and already primed with ***Synflorix™*** should receive 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine. The interval between the pneumococcal conjugate vaccine (***Synflorix™***) and the 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine should not be less than 8 weeks. There are no data available to indicate whether the administration of pneumococcal polysaccharide vaccine to ***Synflorix™*** primed children may result in hyporesponsiveness to further doses of pneumococcal polysaccharide or to pneumococcal conjugate vaccine.

Prophylactic administration of antipyretics before or immediately after vaccine administration can reduce the incidence and intensity of post-vaccination febrile reactions. Clinical data generated with paracetamol and ibuprofen suggest that the prophylactic use of paracetamol might reduce the fever rate, while prophylactic use of ibuprofen showed a similar effect in reducing fever rate. The clinical data suggest that paracetamol might reduce the immune response to ***Synflorix™***. However, the clinical relevance of this observation is not known.

The use of prophylactic antipyretic medicinal products is recommended:

- for all children receiving ***Synflorix™*** simultaneously with vaccines containing whole cell pertussis because of higher rate of febrile reactions (see section Side effects).
- for children with seizure disorders or with a prior history of febrile seizures.

Antipyretic treatment should be initiated according to local treatment guidelines.

Pregnancy and lactation

As ***Synflorix™*** is not intended for use in adults, adequate human data on use during pregnancy or lactation and adequate animal reproduction studies are not available.

Overdose

No case of overdose has been reported.

Precautions for handling

Studies with an 11-valent vaccine formulation representative for ***Synflorix™*** revealed no special hazard for humans based on conventional studies of safety pharmacology, single and repeated dose toxicity.

Incompatibilities

In the absence of compatibility studies, this medicinal product must not be mixed with other medicinal products.

PHARMACOLOGICAL PROPERTIES

For this section see WHO Product Information on the WHO website

STORAGE

The expiry date of the vaccine is indicated on the label and packaging.

Store in a refrigerator (2°C – 8°C).

Do not freeze.

Store in the original package in order to protect from light.

For storage condition after first opening of the vial, see section Administration.

PRESENTATION

Synflorix™ is presented in a vial (type I glass) for 4 doses (2 ml) with a stopper (butyl rubber). Pack size of 100.

Vaccine Vial Monitor (see VVM pictogram at the end of the leaflet)

The Vaccine Vial Monitor (VVM) is part of the 4-dose vial label used for all ***Synflorix™*** batches supplied by GlaxoSmithKline Biologicals. The colour dot that appears on the 4-dose vial label is a VVM. This is a time-temperature sensitive dot that provides an indication of the cumulative heat to which the vial has been exposed. It warms the end user when exposure to heat is likely to have degraded the vaccine beyond an acceptable level.

The interpretation of the VVM is simple. Focus on the central square. Its colour will change progressively. As long as the colour of this square is lighter than the colour of the ring, then the vaccine can be used. As soon as the colour of the central square is the same colour as the ring or of a darker colour than the ring, then the vial should be discarded.

It is absolutely critical to ensure that the storage conditions specified above (in particular the cold chain) are complied with. GlaxoSmithKline Biologicals will assume no liability in the event ***Synflorix™*** has not been stored in compliance with the storage instructions.

For further information, please contact the manufacturer.

Synflorix is a trade mark of the GSK group of companies.

DESCRIPTION

Synflorix™ suspension pour préparations injectables

Vaccin pneumococcique polysaccharidique conjugué (adsorbé)

Une dose (0,5 ml) contient 1 microgramme de polysaccharide pour les sérotypes [1,2] 1, 5, 6B, 7F, 9V, 14 et 23F, et 3 microgrammes de polysaccharide pour les sérotypes 4, 18C et 19F, chacun :

[3] adsorbé sur phosphate d'aluminium	0,5 milligramme Al3+
[4] conjugué à la protéine vectrice D (dérivée d'*Haemophilus influenzae non typable*)	9-16 microgrammes
[5] conjugué à la protéine vectrice de l'anatoxine tétanique	5-10 microgrammes
[6] conjugué à la protéine vectrice de l'anatoxine diphtérique	3-6 microgrammes

Excipients : chlorure de sodium, 2-phénoxyéthanol, eau pour injections.

ADMINISTRATION

Synflorix™ est administré par injection intramusculaire. Les sites recommandés sont la face antéro-latérale de la cuisse chez les nourrissons ou le muscle deltoïde chez les jeunes enfants (voir aussi les rubriques « Schéma de vaccination » et « Précautions »).

Synflorix™ se présente sous forme de suspension blanche trouble. Un fin dépôt blanc avec un surnageant incolore limpide peut être observé durant le stockage du flacon. Cela ne constitue pas un signe de détérioration.

Avant l'administration, le contenu du flacon doit être examiné avant et après l'avoir agité pour détecter la présence de particules étrangères et/ou un aspect physique anormal.

En cas de présence de particules étrangères ou de modification de l'aspect, ne pas utiliser le vaccin.

Le vaccin doit être amené à température ambiante avant utilisation.

Bien agiter le vaccin avant utilisation.

Après ouverture, le flacon multidoses doit être conservé au réfrigérateur (2°C – 8°C).

Le flacon de 4 doses de ***Synflorix™*** duquel une ou plusieurs doses de vaccin ont été prélevées durant une séance de vaccination peut être utilisé pour les séances de vaccination suivantes pendant un maximum de 28 jours, pourvu que toutes les conditions suivantes soient respectées (comme décrit dans la Déclaration de politique générale de l'OMS : utilisation au cours de séances ultérieures de vaccination de flacons de vaccin multidoses entamés (WHO/IVB/00.09)) :

- la date d'expiration n'est pas dépassée ;
- les vaccins sont stockés dans des conditions respectueuses de la chaîne du froid ;
- la membrane du flacon de vaccination n'a pas été plongée dans l'eau ;
- une technique aseptique a été utilisée pour retirer toutes les doses ;
- la jauge de contrôle du vaccin (VVM), s'il en est pourvu, n'a pas atteint le point limite d'utilisation.

Tout produit non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

SCHÉMA DE VACCINATION

Immunisation active contre les infections invasives, la pneumonie et les otites moyennes aiguës causées par *Streptococcus pneumoniae* chez les nourrissons et enfants âgés de 6 semaines à 5 ans. Voir rubriques « Précautions » et « Propriétés pharmacologiques » pour les informations sur la protection contre les sérotypes pneumococciques spécifiques.

Synflorix™ doit être utilisé selon les recommandations officielles qui tiennent compte de l'impact des maladies pneumococciques dans les différents groupes d'âge ainsi que de la variabilité de l'épidémiologie dans les différentes zones géographiques.

Schéma de vaccination

Nourrissons âgés de 6 semaines à 6 mois :

Primovaccination en trois doses

Le schéma de primovaccination recommandé pour garantir une protection optimale comporte quatre doses de 0,5 ml chacune. Chez le nourrisson, la primovaccination comporte trois doses, la première dose étant généralement administrée à l'âge de 2 mois, avec un intervalle d'au moins un mois entre chaque dose. La première dose peut être administrée dès l'âge de 6 semaines.

Une dose de rappel (quatrième dose) est recommandée 6 mois au moins après la dernière dose de primovaccination et peut être administrée dès l'âge de 9 mois (de préférence entre l'âge de 12 et 15 mois) (voir rubriques « Précautions » et « Propriétés pharmacologiques »).

Primovaccination en deux doses

Sinon, lorsque ***Synflorix™*** est administré dans le cadre d'un programme de vaccinations infantiles de routine, un schéma comportant trois doses de 0,5 ml chacune peut être utilisé. La première dose peut être administrée dès l'âge de 6 semaines et une seconde 2 mois plus tard. Une dose de rappel (troisième dose) est recommandée 6 mois au moins après la dernière dose de la primovaccination et peut être administrée dès l'âge de 9 mois de préférence entre 12 et 15 mois) (voir rubrique « Propriétés pharmacologiques »).

Nourrissons et enfants ≥ 7 mois non vaccinés :

- Nourrissons âgés de 7 à 11 mois : le schéma de primovaccination comporte deux doses de primovaccination de 0,5 ml administrées à intervalle d'au moins un mois entre chaque dose. Une dose de rappel (troisième dose) est recommandée au cours de la deuxième année de vie avec un intervalle d'au moins 2 mois après la dernière dose de primovaccination.
- Enfants âgés de 12 mois à 5 ans : le schéma de primovaccination comporte deux doses de 0,5 ml administrées à intervalle d'au moins 2 mois entre chaque dose.

Les recommandations officielles devront être prises en compte pour la vaccination par ***Synflorix™*** (pour les prématurés, voir rubriques « Effets indésirables » et « Propriétés pharmacologiques »).

Il est recommandé que les sujets qui reçoivent une première dose de ***Synflorix™*** terminent le schéma de vaccination complet avec ***Synflorix™***.

Populations particulières

Chez les personnes dont les affections sous-jacentes prédisposent à une infection invasive pneumococcique (telles que la drépanocytose ou l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]), ***Synflorix™*** peut être administré (voir rubriques « Mises en garde spéciales et précautions d'emploi » et « Propriétés pharmacologiques ») :

- chez les nourrissons, comme décrit ci-dessus sous « Primovaccination en trois doses » ;
- chez les enfants non vaccinés âgés ≥ 7 mois et de moins de 2 ans, comme décrit ci-dessus sous « Nourrissons et enfants ≥ 7 mois non vaccinés ».

Population pédiatrique

L'innocuité et l'efficacité de ***Synflorix™*** chez les enfants âgés de plus de 5 ans n'ont pas été établies.

Utilisation avec d'autres vaccins

Synflorix™ peut être co-administré avec les vaccins monovalents ou combinés suivants (incluant DTCa-HepB, PVI/Hib et DTCeHepB/Hib) : vaccin diphtérique, tétanique, acellulaire pour enfants et adolescents (DTCa), vaccin contre l'hépatite B (HepB), vaccin poliomyélitique inactivé (VPI), vaccin *Haemophilus influenzae* type b vaccine (Hib), vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux à germes entiers (DTCe), vaccin rougeole, oreillons, rubéole (ROR), vaccin varicelleux (V), vaccin méningococcique C conjugué (vaccins conjugués à la protéine CRM_{197} et à l'anatoxine tétanique), vaccin méningococcique A, C, W-135 et Y conjugué (conjugué à l'anatoxine tétanique), vaccin poliomyélitique oral (VPO) et vaccin oral contre le rotavirus. Les différents vaccins injectables doivent toujours être administrés à des sites d'injection différents. Les études cliniques ont démontré que les réponses immunitaires et les profils de tolérance des vaccins co-administrés n'étaient pas modifiés, à l'exception de la réponse au poliovirus inactivé de type 2 inactivé, pour laquelle des résultats inconstants ont été observés dans les études (séroprotection variant de 79 % à 100 %). De plus, lorsque le vaccin méningococcique A, C, W-135 et Y conjugué (conjugué à l'anatoxine tétanique) a été administré simultanément avec une dose de rappel de ***Synflorix™*** au cours de la deuxième année de vie d'enfants primovaccinés avec 3 doses de ***Synflorix™***, une moyenne géométrique de concentrations (MGC) et une moyenne géométrique des titres (MGT) par test OPA (activité fonctionnelle opsonisante) en anticorps plus faibles ont été observées pour un sérotype pneumococcique (18C). L'administration concomitante n'a eu aucune répercussion sur les neuf autres sérotypes pneumococciques. Une augmentation de la réponse immunitaire au conjugué Hib-protéine tétanique et aux antigènes diphtériques et tétaniques a été observée. La pertinence clinique de ces observations est inconnue.

Utilisation avec des traitements immunosuppresseurs systémiques

Comme avec les autres vaccins, il est possible qu'une réponse adéquate ne soit pas obtenue chez les patients recevant un traitement immunosuppresseur.

Utilisation avec des antipyrétiques en traitement prophylactique

Voir rubrique « Précautions ».

EFFETS INDÉSIRABLES

Résumé du profil d'tolérance

L'évaluation de la sécurité de ***Synflorix™*** s'est fondée sur des études cliniques impliquant l'administration de 63 905 doses de ***Synflorix™*** en primovaccination à 22 429 enfants sains et 137 prématurés, et de plus, 19 466 enfants et 116 prématurés ont reçu une dose de rappel de ***Synflorix™*** au cours de leur deuxième année de vie. La sécurité a également été évaluée chez 435 enfants auparavant non vaccinés de 2 à 5 ans, parmi lesquels 285 ont reçu 2 doses de ***Synflorix™***.

Dans toutes les études, ***Synflorix™*** a été administré simultanément avec les vaccins pédiatriques recommandés.

Chez les nourrissons, les réactions indésirables les plus fréquentes observées après la primovaccination ont été une rougeur au site d'injection et une irritabilité, qui sont survenues après environ 41 % et 55 % respectivement de toutes les doses. Après la vaccination de rappel, les réactions indésirables les plus fréquentes étaient également la douleur au site d'injection et l'irritabilité, survenues respectivement dans environ 51 % et 53 % des cas. La majorité de ces réactions a été d'intensité légère à modérée et de courte durée.

Aucune augmentation de l'incidence ou de la sévérité des réactions indésirables n'a été observée après l'administration des doses suivantes du schéma de primovaccination.

La réactogénicité locale du programme de primovaccination était similaire chez les nourrissons de moins de 12 mois et chez les enfants de plus de 12 mois, sauf pour la douleur au site d'injection, dont l'incidence augmentait avec l'âge : la douleur a été signalée chez plus de 39 % des nourrissons de moins de 12 mois et chez plus de 58 % des enfants âgés de plus de 12 mois.

Après la vaccination de rappel, les enfants de plus de 12 mois sont plus susceptibles de présenter des réactions au site d'injection par rapport aux proportions constatées chez les nourrissons lors de la primovaccination avec ***Synflorix™***.

Après une vaccination de rattrapage chez des enfants âgés de 12 à 23 mois, une urticaire a été signalée plus fréquemment (effet indésirable peu fréquent) par rapport aux proportions constatées chez les nourrissons lors de la primovaccination et de la vaccination de rappel.

La réactogénicité a été plus élevée chez les enfants recevant simultanément un vaccin coquelucheux à germes entiers. Dans une étude clinique, les enfants ont reçu ***Synflorix™*** (n = 603) ou Prevenar 7-valent (n = 203) avec un vaccin DTCa. Après la primovaccination, une fièvre ≥ 38°C et > 39°C a été rapportée respectivement chez 86,1 % et 14,7 % des enfants ayant reçu ***Synflorix™*** et 82,8 % et 11,6 % des enfants vaccinés avec Prevenar 7-valent.

Dans les études cliniques comparatives, l'incidence d'événements indésirables locaux et systémiques rapportés dans les 4 jours suivant chaque dose de vaccination a été comparable à celle observée après la vaccination avec Prevenar 7-valent.

Liste tabulée des effets indésirables présentée sous forme de tableau

Les réactions indésirables (pour toutes les classes d'âge) considérées comme ayant une relation au moins possible avec la vaccination ont été classifiées par fréquences.

Les fréquences sont définies comme :

Très fréquent :	(≥ 1/10)
Fréquent :	(≥ 1/100, < 1/10)
Peu fréquent :	(≥ 1/1 000, < 1/100)
Rare :	(≥ 1/10 000, < 1/1 000)
Très rare :	(<1/10 000)

Classe de système d'organe	Fréquence	Réactions indésirables
Essais cliniques		
Affections du système immunitaire	Rare	Réactions allergiques (telles que dermatite allergique, dermatite atopique, eczéma)
	Très rare	Angioœdème
Troubles du métabolisme et de la nutrition	Très fréquent	Perte d'appétit
Affections psychiatriques	Très fréquent	Irritabilité
	Peu fréquent	Pleurs anormaux
Affections du système nerveux	Très fréquent	Somnolence
	Rare	Convulsions (y compris convulsions fébriles)
Affections vasculaires	Très rare	Maladie de Kawasaki
Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales	Peu fréquent	Apnée chez les grands prématurés (≤ 28 semaines de gestation) (voir rubrique « Précautions »)
Affections gastro-intestinales	Peu fréquent	Diarrhée, vomissements
Affections de la peau et du tissu sous-cutané	Peu fréquent	Eruption cutanée
	Rare	Urticaire
Troubles généraux et anomalies au site d'administration	Très fréquent	Douleur, rougeur, gonflement au site d'injection, fièvre ≥ 38°C au niveau rectal (âge < 2 ans)
	Fréquent	Réactions au site d'injection, par ex. induration, fièvre > 39°C au niveau rectal (âge < 2 ans)
	Peu fréquent	Réactions au site d'injection, par ex. hématome, hémorragie et nodule
Réactions indésirables supplémentaires observées après la vaccination de rappel suite à la primovaccination ou après une vaccination de rattrapage :		
Affections du système nerveux	Peu fréquent	Céphalées (âge 2 à 5 ans)
Affections gastro-intestinales	Peu fréquent	Nausées (âge 2 à 5 ans)
Troubles généraux et anomalies au site d'administration	Fréquent	Fièvre ≥ 38°C au niveau rectal (âge 2 à 5 ans)
	Peu fréquent	Réactions au site d'injection, par ex. prurit, fièvre > 40 °C au niveau rectal (âge < 2 ans), fièvre > 39°C au niveau rectal (âge 2 à 5 ans), gonflement diffus du membre injecté, parfois impliquant l'articulation voisine

Données de pharmacovigilance		
Affections du système immunitaire	Très rare	Anaphylaxie
Affections du système nerveux	Rare	Episode d'hypotonie-hyporéactivité

Populations particulières

La sécurité d'emploi de ***Synflorix™*** a été évaluée chez 83 enfants séropositifs (VIH+/+) (asymptomatiques ou avec symptômes légers selon la classification de l'OMS), 101 enfants séronégatifs nés de mères séropositives (VIH+/-) et 50 enfants atteints de drépanocytose recevant une primovaccination. Parmi ceux-ci, 76, 96 et 49 enfants respectivement ont reçu une dose de rappel. La sécurité d'emploi de ***Synflorix™*** a également été évaluée chez 50 enfants souffrant de drépanocytose commençant la vaccination à 7-11 mois, tous recevant la dose de rappel, et chez 50 enfants souffrant de drépanocytose commençant la vaccination à 12-23 mois. Les résultats suggèrent une réactogénicité et un profil de sécurité de ***Synflorix™*** comparables entre ces groupes à haut risque et ces enfants sains.

CONTRE-INDICATIONS

Synflorix™ ne doit pas être administré chez les sujets présentant une hypersensibilité connue à l'un des composants du vaccin (voir rubrique Description).

Comme avec les autres vaccins, l'administration de ***Synflorix™*** doit être différée chez les sujets présentant un syndrome fébrile aigu. Cependant, la présence d'une infection mineure telle qu'un rhume ne constitue pas une contre-indication à la vaccination.

PRÉCAUTIONS

La bonne pratique clinique consiste à faire précéder la vaccination d'une anamnèse (en particulier en ce qui concerne les vaccinations précédentes et la survenue éventuelle d'événements indésirables) et d'un examen clinique.

Comme avec tous les vaccins injectables, il est recommandé de toujours disposer d'un traitement médical approprié et d'assurer une surveillance pour le rare cas où surviendrait une réaction anaphylactique après l'administration du vaccin.

Le risque potentiel d'apnée et la nécessité d'une surveillance respiratoire pendant 48 à 72 heures doivent être pris en compte lors de l'administration du schéma de primovaccination à de grands prématurés (nés ≤ 28 semaines de grossesse ou moins) et notamment chez les nourrissons ayant des antécédents d'immaturité respiratoire. Le bénéfice de la vaccination étant élevé chez ces nourrissons, la vaccination ne doit pas être suspendue ou reportée.

Synflorix™ ne doit en aucun cas être administré par voie intravasculaire ou intradermique. Il n'existe pas de données sur l'administration sous-cutanée de ***Synflorix™***.

Chez les enfants à partir de 2 ans, une syncope (évanouissement) peut se produire après ou même avant toute vaccination en réponse d'origine psychique à l'injection par aiguille. Il est important de pratiquer les injections dans un endroit permettant d'éviter les blessures liées à l'évanouissement.

Comme avec les autres vaccins administrés par voie intramusculaire, ***Synflorix™*** doit être administré avec prudence chez les sujets présentant une thrombopénie ou des troubles de la coagulation en raison du risque de saignement qui peut survenir après une injection intramusculaire chez ces sujets.

Les recommandations officielles pour la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et l'*Haemophilus influenzae* de type b doivent également être suivies.

Il n'y a pas de preuve suffisante quant à une protection de ***Synflorix™*** contre des sérotypes pneumococciques non inclus dans le vaccin excepté pour le sérotype 19A par réaction croisée (voir rubrique « Propriétés pharmacologiques ») ou contre l'*Haemophilus influenzae* non typable. ***Synflorix™*** ne protège pas contre d'autres micro-organismes.

Comme pour tout vaccin, ***Synflorix™*** peut ne pas protéger tous les sujets vaccinés contre les infections pneumococciques invasives, les pneumonies ou les otites moyennes dans des séroptypes vaccinaux et au sérotype 19A par réaction croisée. De plus, les otites moyennes et les pneumonies étant dues à de nombreux micro-organismes autres que les sérotypes de *Streptococcus pneumoniae*, la protection globale attendue contre ces maladies est limitée et nettement plus faible que la protection contre les maladies invasives causées par les sérotypes vaccinaux et le sérotype 19A (voir rubrique « Propriétés pharmacologiques »).

Dans les études cliniques, ***Synflorix™*** a induit une réponse immunitaire pour les dix sérotypes contenus dans le vaccin, mais le taux de réponse variait selon les sérotypes. La réponse immunitaire fonctionnelle aux sérotypes 1 et 5 a été d'une amplitude plus faible que celle observée avec les autres sérotypes vaccinaux. On ne sait pas si la réponse immunitaire fonctionnelle plus faible contre les sérotypes 1 et 5 pourrait entraîner une efficacité protectrice plus faible contre les infections invasives, les pneumon

Poblaciones especiales
Se evaluó la seguridad de *Synflorix™* en 83 lactantes seropositivos (VIH-+/+) (asintomáticos o con síntomas leves según la clasificación de la OMS), 101 lactantes que nacieron VIH negativos de madres seropositivas (VIH-+/-) y 50 lactantes con anemia drepanocítica (SCD), que recibieron vacunación primaria. De esos, 76, 96 y 40 lactantes, respectivamente, recibieron una dosis de refuerzo. También se evaluó la seguridad de *Synflorix™* en 50 niños con SCD que iniciaron la vacunación antes de los 7 y 11 meses de edad, todos recibieron la vacunación de refuerzo, y 50 niños con SCD que iniciaron la vacunación entre los 12 y 23 meses de edad. Los resultados sugieren reactogenicidad comparable y perfil de seguridad de *Synflorix™* dentro grupos de alto riesgo y niños saludables.
CONTRAINDICACIONES
Synflorix™ no debera administrarse a sujetos con hipersensibilidad conocida a cualquiera de los componentes de la vacuna (véase la sección Descripción). Al igual que con otras vacunas, la administración de *Synflorix™* deberá posponerse en sujetos que padezcan una enfermedad febril severa aguda. Sin embargo, la presencia de una infección menor, como un resfriado, no debería ser causa del aplazamiento de la vacunación.
PRECAUCIONES
Es una buena práctica clínica que la vacunación sea precedida por un examen del historial médico (especialmente en lo que se refiere a vacunaciones previas y la posibilidad de incidencia de reacciones inesperadas) y un reconocimiento médico.
Al igual que con todas las vacunas inyectables, siempre deberá contarse con el tratamiento y supervisión médicos apropiados para el caso poco común de presentarse una reacción anafiláctica después de la administración de la vacuna.
Deberá considerarse el riesgo potencial de apnea y la necesidad de que se efectúe monitoreo respiratorio durante 48-72 h cuando se administre la serie de inmunización primaria a lactantes muy prematuros (nacidos ≤ 28 semanas de gestación) y especialmente en aquellos con antecedente previo de falta de maduración respiratoria. Debido a que el beneficio de la vacunación es alto en este grupo de lactantes, la vacunación no deberá omitirse o retrasarse.
Synflorix™ no debera administrarse por via intravascular o intradermica bajo ninguna circunstancia. No se dispone de datos sobre la administración subcutánea de *Synflorix™*.
En niños de 2 años puede producirse un síncope (desmayo) posteriormente a, o incluso antes de la aplicación de cualquier vacuna como respuesta psicógena a las agujas. Es importante contar con procedimientos para evitar lesiones como resultado de un desmayo.
Al igual que para otras vacunas de administración intramuscular, deberá tenerse precaución al administrar *Synflorix™* a individuos con trombocitopenia o cualquier trastorno de la coagulación ya que podría ocurrir sangrado tras una administración intramuscular a estos sujetos.
También deben seguirse las recomendaciones oficiales para las inmunizaciones contra la difteria, tétanos y Haemophilus influenzae tipo b.
No hay evidencias suficientes de que *Synflorix™* proteja contra serotipos de neumococo que no se encuentren en la vacuna, excepto el serotipo de reacción cruzada 19A (ver la sección "Propiedades farmacológicas") o contra Haemophilus influenzae no tipificable. *Synflorix™* no protege contra otros microorganismos.
Como cualquier otra vacuna, *Synflorix™* podría no proteger a todos los individuos vacunados contra la enfermedad neumocócica invasiva, neumonía o otitis media causada por los serotipos de la vacuna y el serotipo de reacción cruzada 19A. Además, como la otitis media y la neumonía son causadas por muchos microorganismos diferentes de los serotipos *Streptococcus pneumoniae* representados por la vacuna, se espera que la protección total contra estas enfermedades sea limitada y sustancialmente menor que la protección contra enfermedades invasivas causadas por serotipos contenidos en la vacuna y el serotipo 19A (ver la sección "Propiedades farmacológicas").
En ensayos clínicos, *Synflorix™* provocó una respuesta inmunitaria a los diez serotipos incluidos en la vacuna, pero la magnitud de las respuestas varió entre los serotipos. La respuesta inmunitaria funcional a los serotipos 1 y 5 fue inferior en magnitud que la respuesta contra los demás serotipos de la vacuna. Se desconoce si la respuesta inmunitaria funcional inferior contra los serotipos 1 y 5 resultará en una eficacia de protección menor contra enfermedades invasivas, neumonía o otitis media causada por estos serotipos (ver la sección "Propiedades farmacológicas").
Synflorix™ se indica para niños de 6 semanas hasta los 5 años de edad. Los niños deben recibir la dosis de *Synflorix™* adecuada para su edad al momento de comenzar con la serie de vacunas (ver la sección "Esquema de inmunización"). Los datos de seguridad e inmunogenicidad aún no están disponibles para niños mayores de 5 años.
Los niños con una semididad inmunitaria deficiente, sea debido al uso de terapia inmunosupresora, un defecto genético, infección por VIH, exposición prenatal a terapia antiretroviral o VIH o otras causas, pueden tener una respuesta inmunitaria reducida frente a la vacunación.
Se dispone de datos de seguridad e inmunogenicidad para lactantes infectados por VIH (asintomáticos o con síntomas leves según la clasificación de la OMS), lactantes que nacieron VIH negativos de madres seropositivas y niños con anemia drepanocítica (ver las secciones "Efectos secundarios" y "Propiedades farmacológicas"). No se dispone de datos de respuesta de la inmunogenicidad de *Synflorix™* para individuos en otros grupos inmunocomprometidos específicos y la vacunación debe considerarse según cada caso en particular (ver la sección "Posología y método de administración").
Los niños menores de 2 años deben recibir la serie de vacunas de *Synflorix™* iniciando por su edad (ver la sección "Esquema de inmunización"). El uso de vacunas de conjugado de neumococo no reemplaza el uso de las vacunas de polisacárido neumocócico 23-valente en niños de > 2 años con enfermedades (como anemia drepanocítica, asplenia, infección por VIH, enfermedad crónica) a aquellos con otras afecciones inmunocomprometidas) que los exponen a un riesgo mayor ante enfermedades invasivas debido a *Streptococcus pneumoniae*. Cuando se recomiende, los niños en riesgo que tengan ≥ 24 meses de edad y ya estén inmunizados con *Synflorix™* deben recibir la secuencia de polisacárido neumocócico 23-valente. El intervalo entre la vacuna conjugada contra neumococo (*Synflorix™*) y la vacuna de polisacárido neumocócico 23-valente no debe ser menor a 8 semanas. No hay datos disponibles que indiquen si la administración de la vacuna de polisacárido neumocócico en niños inmunizados con *Synflorix™* pueda resultar en una respuesta disminuida a dosis adicionales de la vacuna de polisacárido neumocócico 23-valente en niños previamente vacunados.
La administración profiláctica de antipiréticos antes o inmediatamente después de la administración de la vacuna puede reducir la incidencia e intensidad de las reacciones febriles posvacunación. Datos clínicos generados con paracetamol e ibuprofeno sugieren que el uso profiláctico de paracetamol puede reducir el índice de fiebre, mientras que el uso profiláctico de ibuprofeno presentó un efecto limitado en la reducción del índice de fiebre. Los datos clínicos sugieren que el paracetamol podría reducir la respuesta inmunitaria a *Synflorix™*. Sin embargo, se desconoce la relevancia clínica de esta observación.
Se recomienda el uso de productos medicinales antipiréticos profilácticos:
- para todos los niños que reciben *Synflorix™* simultáneamente con vacunas que contienen pertussis de célula entera debido al mayor índice de reacciones febriles (ver la sección "Efectos secundarios").
- para niños con trastornos convulsivos o con antecedentes de trastornos convulsivos febriles.

El tratamiento antipirético debe iniciarse de acuerdo con las guías locales de tratamiento
Embarazo y lactancia
Debido a que *Synflorix™* no está indicado para uso en adultos, no se dispone de datos adecuados en seres humanos en cuanto al uso durante el embarazo o la lactancia, ni de estudios de reproducción apropiados en animales.
Sobredosis
No se reportaron casos de sobredosis.
Datos preclínicos sobre seguridad
Estudios con una formulación de vacuna 11-valente representativa de *Synflorix™* no revelaron ningún peligro especial para humanos con base en estudios convencionales de farmacología de seguridad, de toxicidad de dosis repetidas y reproductiva.
Incompatibilidades
En ausencia de estudios de compatibilidad, este producto medicinal no debe mezclarse con otros medicamentos.
PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS
Para esta sección, consulte la información de prescripción de la OMS en el sitio web de la OMS.
CONSERVACIÓN
La fecha de caducidad de la vacuna está indicada en la etiqueta y en el envase.
Almacenar en un refrigerador (2°C – 8°C).
No congelar.
Almacenar en el envase original para proteger de la luz.
Para obtener información sobre las condiciones de almacenamiento una vez abierto, consulte la sección Administración.
PRESENTACIÓN
Synflorix™ se presenta en un frasco ámpula (vidrio tipo I) para 4 dosis (2 ml) con una tapa (goma butílica). Tamaño de paquete de 100.
Monitor del Frasco Ampula de la Vacuna por el grupo de empaque "Vaccine Vial Monitor" (VVM) al final del proyecto
El Monitor del Frasco Ampula de la Vacuna (VVM) forma parte de la etiqueta del frasco ámpula de 4 dosis que se utiliza en todos los lotes de *Synflorix™* suministrados por GlaxoSmithKline Biologicals. El punto de color que aparece en la etiqueta del frasco ámpula para 4 dosis es un VVM. Se trata de un punto sensible al tiempo y a la temperatura que ofrece una indicación del calor acumulado al que se ha visto expuesto el frasco ámpula. Adiferte al usuario final cuando sea probable que la exposición al calor haya degradado la vacuna a un nivel muy por debajo de aceptable.
La interpretación del VVM es sencilla. Fijese en el cuadrado central. Su color cambiará progresivamente. Siempre y cuando el color de este cuadrado sea más claro que el color del anillo, entonces podrá usarse la vacuna. En cuanto el color del cuadrado central sea el mismo, o más oscuro, que el del anillo, deberá desechar el frasco ámpula.
Es absolutamente crítico asegurarse de que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas anteriormente (en particular la cadena de frío). GlaxoSmithKline Biologicals se asume ninguna responsabilidad si en el caso de que *Synflorix™* se haya conservado de conformidad con las instrucciones de almacenamiento.
Para mayor información, por favor póngase en contacto con el fabricante.
Synflorix es una marca comercial del grupo de compañías GSK.

DESCRIPCIÓN
Synflorix™ - suspensión para inyección
Vacuna antineumocócica polisacarídica conjugada (adsorbida)
Una dosis (0,5 ml) contiene 1 microgramo de polisacárido des serotipos 1[1,2], 5[1,2], 6B[1,2], 7F[1,2], 9V[1,2], 14[1,2] e 23F[1,2], e 3 microgramos de polisacárido dos serotipos 4[1,2], 18C[1,2] e 19F[1,2].

[1] adsorvido em fosfato de alumínio	0,5 miligramas de Al^{3+}
[2] conjugado com a proteína D (derivada do *Haemophilus influenzae* não tipável) como proteína portadora	9-16 microgramas
[2] conjugado com a proteína portadora do toxóide tetânico	5-10 microgramas
[2] conjugado com a proteína portadora do toxóide diftérico	3-6 microgramas

Excipientes: cloreto de sódio, 2-fenoxietanol, água para injetáveis
ADMINISTRAÇÃO
O frasco de *Synflorix™* deve ser administrado como injeção intramuscular. Os locais preferidos são a região ântero-lateral da coxa nos lactentes ou o músculo deltóide do braço em crianças pequenas (possuir também as seções Programa de Imunização e Precauções).
O Synflorix™ é uma suspensão branca turva. É possível observar um depósito fino branco com um sobrenadante incolor transparente após o armazenamento do frasco para injeções/ou que, no entanto, não constitui um sinal de deterioração.
O conteúdo do frasco para injeções/ou deve ser inspecionado visualmente antes e depois da agitação para detecção de partículas estranhas e/ou de um aspecto físico anormal antes de administrar.
Caso sejam observadas, a vacina deve ser eliminada.
Deve-se permitir que a vacina alcance a temperatura ambiente antes de uso.
A vacina deve ser bem agitada antes da utilização.
Depois de aberto, o frasco multidose deve ser mantido em um refrigerador (2 °C - 8 °C).
- O frasco de 4 doses de *Synflorix™*, de qual uma ou mais doses de vacina foram removidas durante uma sessão de imunização, pode ser usado em sessões de imunização subsequentes, por no máximo 28 dias, desde que todas as condições a seguir sejam atendidas (conforme descrito na declaração de política da OMS. O uso de frascos multidose abertos em sessões de imunização subsequentes. OMS/WAB/00.09):
- O frasco está dentro da validade.
- As vacinas estão armazenadas de acordo com as condições apropriadas de cadeia de frio;
- O septo do frasco da vacina não foi submerso em água;
- Todas as doses foram retiradas com a utilização da técnica asséptica;
- O Monitor de Frasco para Injetáveis da Vacina (MFIV), se presente, não está no ponto de descarte.

Os produtos não utilizados ou os resíduos devem ser eliminados de acordo com as exigências locais.

PROGRAMA DE VACINAÇÃO
Imunização ativa contra a doença invasiva, pneumonia e a otite média aguda causadas pelo *Streptococcus pneumoniae* em lactentes e crianças a partir das 6 semanas até aos 5 anos de idade. Consulte as seções "Precauções" e "Propriedades farmacológicas" para informação sobre proteção contra serotipos pneumocócicos específicos.
O uso do *Synflorix™* deve ser determinado com base em recomendações oficiais levando em consideração o impacto em doenças pneumocócicas em diferentes faixas etárias, bem como a variabilidade da epidemiologia em diferentes áreas geográficas.
Programa de vacinação
Lactentes entre as 6 semanas e os 6 meses de idade
Esquema de imunização primária de três doses
O esquema de imunização recomendado que garante proteção otimizada consiste em quatro doses de 0,5 ml cada uma. O esquema de imunização primária infantil consiste em três doses, sendo a primeira geralmente administrada aos 2 meses e com intervalo de pelo menos 1 mês entre as doses. A primeira dose pode ser administrada em bebês com idade mínima de 4 semanas.
Recomenda-se uma quarta dose de reforço pelo menos 6 meses após a última dose primária e preferencialmente, podendo ser administrada do 9 meses em diante (de preferência entre 12 e 15 meses de idade) (ver as seções "Precauções" e "Propriedades farmacológicas").
Esquema de imunização primária de duas doses
Alternativamente, quando a *Synflorix™* é dado como parte de um programa de imunização infantil rotineiro, pode-se usar um esquema de três doses de 0,5 ml cada uma. A primeira dose pode ser administrada já às 6 semanas de idade, com a segunda dose administrada dois meses depois. Recomenda-se uma (terceira) dose de reforço pelo menos 6 meses após a administração da última dose primária, podendo ser administrada dos 9 meses em diante (de preferência entre 12 e 15 meses de idade) (ver a seção Propriedades farmacológicas).
Lactentes e crianças não vacinados a 7 meses de idade:
- lactentes com idade entre 7 e 11 meses: O esquema de vacinação consiste em duas doses primárias de 0,5 ml administradas com um intervalo de pelo menos 1 mês entre as doses. Recomenda-se uma (terceira) dose de reforço no segundo ano de vida com um intervalo de pelo menos 2 meses após a última dose primária.
- crianças com idade entre 12 meses e 5 anos: O esquema de vacinação consiste em duas doses de 0,5 ml administradas com um intervalo de pelo menos 2 meses entre as doses.

As recomendações oficiais devem ser tidas em consideração quando se efetua a imunização com *Synflorix™* (para lactentes prematuros, ver as seções Reações adversas e Propriedades farmacológicas).
Recomenda-se que as crianças que receberam uma primeira dose de *Synflorix™* completem todo o ciclo de vacinação com *Synflorix™*.
Populações especiais
Não individuais que tiveram condições subjacentes que os predispõem a doença pneumocócica invasiva (como anemia falciforme ou infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV)), o *Synflorix™* pode ser administrado (veja as seções "Precauções especiais de utilização" e "Propriedades farmacológicas"):
- em lactentes, conforme descrito em "Esquema de imunização primária de três doses", acima.
- em crianças não vacinadas a 7 meses de idade e menores de 2 anos de idade, conforme descrito em "Lactentes e crianças não vacinados a 7 meses de idade", acima.

População pediátrica
A segurança e a eficácia do *Synflorix™* em crianças acima de 5 anos de idade não foram estabelecidas.
Uso com outras vacinas
Synflorix™ pode ser administrado simultaneamente com as seguintes vacinas monovalentes ou combinadas (incluindo DTPa-HBV-IPV/Hib e DTPw-HBV/Hib): vacina contra a difteria-tétano-tosse convulsiva acelular (DTPa), vacina contra a hepatite B (HBV), vacina inactivada contra a poliomielite (IPV), vacina contra o *Haemophilus influenzae* tipo b (Hib), vacina contra a difteria-tétano-tosse convulsiva de célula completa (DTPw), vacina contra o sarampo-papeira-rubéola (MMR), vacina contra a varicela (V), vacina conjugada anti-meningocócica do serogrupo C conjugada com CRM_{197} e TT), vacina conjugada anti-meningocócica do serogrupo A, C, W-135 e Y (conjugada com TT) vacina contra a poliomielite oral (OPV) e vacina oral contra o rotavírus. As diferentes vacinas injetáveis devem ser sempre administradas em locais de injeção diferentes.
Estudos clínicos demonstraram que as respostas imunitárias e os perfis de segurança das vacinas administradas concomitantemente não foram afetados, com exceção da resposta a poliovírus tipo 3 inativado, em relação ao qual se observaram resultados inconsistentes em todos os estudos (a seroproteção variou entre 78% e 100%). Além disso, quando a vacina anti-meningocócica dos sorogrupos A, C, W-135 e Y (conjugada com TT) foi coadministrada com uma dose de reforço do *Synflorix™* (6 semanas após as três primeiras doses) a resposta imune contra 3 dos 10 sorotipos pneumocócicos (4, 6B e 23F) foi menor do que a resposta após a dose de reforço de *Synflorix™* administrada sozinha. Não se observou qualquer aumento da incidência ou da gravidade das reações adversas com as doses subsequentes da série de primovacinação.
A reactogenicidade local do ciclo de primovacinação foi semelhante em lactentes < 12 meses de idade e crianças > 12 meses de idade após exceto para dor no local da injeção no qual o incidente aumentou com o aumento da idade: dor foi relatada em mais de 39% de lactentes < 12 meses de idade e em mais de 58% de crianças > 12 meses de idade.
Após a vacinação de reforço, crianças > 12 meses de idade possuem maior probabilidade de ocorrência de reações no local da injeção comparado com doses observadas em lactentes durante a série de primovacinações com *Synflorix™*.
Após a vacinação de reforço em crianças de 12 a 23 meses de idade, a taxa de soroconversão para os 10 sorotipos vacinados com Prevenar heptavalente.
Em estudos clínicos comparativos, a incidência de acontecimentos adversos locais e gerais notificados no período de 4 dias após cada dose de vacinação estava dentro do mesmo intervalo que após a vacinação com Prevenar heptavalente.
Lista tabulada de reações adversas
As reações adversas (para todos os grupos de idade) que foram consideradas como, pelo menos, possivelmente relacionadas com a vacinação estão listadas de acordo com a frequência:
As frequências são indicadas como:

Muito frequentes:	(≥ 1/10)
Frequentes:	(≥1/100 a <1/10)
Pouco frequentes:	(≥1/1.000 a <1/100)
Raros	(≥1/10.000 a <1/1.000)
Muito raros:	(<1/10.000)

Classe de Sistema de Órgãos	Frequência	Reações Adversas
Ensaios Clínicos		
Doenças do sistema imunitário	Raros	Reações alérgicas (como dermatite alérgica, dermatite atópica, eczema)
	Muito raros	Angioedema
Doenças do metabolismo e da nutrição	Muito frequentes	Perda de apetite
Perturbações do foro psiquiátrico	Muito frequentes	Irritabilidade
	Raros	Insónia (insomnia)
Doenças do sistema nervoso	Muito frequentes	Sonolência
	Raros	Convulsões (incluindo convulsões febris)
Vasculopatias	Muito raros	Síndrome de Kawasaki
Doenças respiratórias, torácicas e do mediastino	Pouco frequentes	Apneia em lactentes muito prematuros (≤ 28 semanas de gestação) (ver secção Precauções)
Doenças gastrointestinais	Pouco frequentes	Diarreia, vómitos
Afecções dos tecidos cutâneos e subcutâneos	Incomum	Exantema cutâneo
	Raros	Urticária
Perturbações gerais e alterações no local de administração	Muito frequentes	Dor, vermelhidão, tumefacção no local de injeção, febre (≥ 38°C, rectal (≥ 2 anos de idade)
	Frequentes	Enduração no local de injeção, febre (> 39°C, rectal) ≥ 2 anos de idade
	Pouco frequentes	Hematoma, hemorragia e nódulo no local de injeção

Reações adversas adicionalmente relatadas após vacinação de reforço da série primária e/ou vacinação intensificada:

Doenças do sistema nervoso	Pouco frequentes	Dor de cabeça (de 2 a 5 anos de idade)
Doenças gastrointestinais	Pouco frequentes	Náusea (de 2 a 5 anos de idade)
Perturbações gerais e alterações no local de administração	Muito frequentes	Febre retal ≥ 38°C (de 2 a 5 anos de idade)
	Pouco frequentes	Inchaço no local de injeção, febre (> 39°C, rectal) ≥ 2 anos de idade

Experiência pós-marketing

Doenças do sistema imunitário	Muito raros	Anafilaxia
Doenças do sistema nervoso	Raros	Episódio hipotónico-hiporresponsivo

Populações especiais
A segurança do *Synflorix™* foi avaliada em 83 lactentes VIH-+/+ (assintomáticos ou com sintomas leves, segundo a classificação da OMS), 101 lactentes HIV-negativos nascidos de mães HIV-positivas (HIV-+/-) e 50 bebés com anemia falciforme, recebendo vacinação primária. Desses, 76, 96 e 49 lactentes, respectivamente, receberam uma dose de reforço. A segurança do *Synflorix™* também foi avaliada em 50 crianças com anemia falciforme que iniciaram a vacinação aos 7-11 meses de idade, todas elas receberam a vacinação de reforço, e em 50 crianças com anemia falciforme iniciando a vacinação com 12-23 meses de idade. Os resultados sugerem perfil de reatogenicidade e segurança comparados ao de *Synflorix™* entre esses grupos de alto risco e crianças saudáveis.
CONTRAINDICAÇÕES
Synflorix™ não deve ser administrado a indivíduos com hipersensibilidade conhecida a qualquer um dos componentes da vacina (ver seções Descrição).
Como com outras vacinas, a administração de *Synflorix™* deve ser adiada em indivíduos com uma doença febril aguda grave. Entretanto, a presença de infecção de menor importância, como uma constipação, não deve causar o adiamento da vacinação.

PRECAUÇÕES
Constitui uma boa prática clínica proceder a vacinação por uma revisão da história clínica (especialmente no que respeita a vacinações anteriores e à possível ocorrência de acontecimentos indesejáveis) e por um exame físico.
Tal como com as outras injectáveis, o tratamento e supervisão médica apropriados deverão estar sempre prontamente disponíveis no caso uma reação anafiláctica rara após a administração da vacina.
Deve ter-se em consideração o risco potencial de apneia e a necessidade de monitorização respiratória durante 48-72 horas quando se administra a série de doses da primo-imunização a lactentes muito prematuros (nascidos com ≤ 28 semanas de gestação) e, especialmente, nos que apresentam antecedentes de imaturidade respiratória. Como o benefício da vacinação é elevado neste grupo de lactentes, a vacinação não deve ser suspensa ou adiada.
Synflorix™ não deve, em circunstância alguma, ser administrado por via intravascular ou intradérmica. Não existem informações sobre a administração subcutânea de *Synflorix™*.
Em crianças com 2 anos de idade, pode ocorrer síncope (desmaio) seguido, ou mesmo antes, de qualquer vacinação como uma resposta psicológica à injeção da agulha. É importante que os procedimentos estejam adequados para evitar ferimentos resultantes de desmaios.
Como com outras vacinas administradas por via intramuscular, *Synflorix™* deve ser administrado com precaução em indivíduos com trombocitopenia ou com uma doença da coagulação dado que pode ocorrer hemorragia após administração intramuscular a estes indivíduos.
Recomendações oficiais para imunização contra difteria, tétano e *Haemophilus influenzae* tipo b também devem ser seguidas.
Não há evidência suficiente de que *Synflorix™* proporciona proteção contra serotipos pneumocócicos não contidos na vacina, exceto o serotipo 19A com reação cruzada (consulte a seção "Propriedades farmacológicas") ou contra *Haemophilus influenzae* não tipável. O *Synflorix™* não fornece proteção contra outros micro-organismos.
Como com qualquer vacina, o *Synflorix™* pode não proteger todos os indivíduos vacinados contra doença pneumocócica invasiva, pneumonia ou otite média causadas pelos serotipos da vacina e o serotipo 19A de reação cruzada. Além disso, como a otite média e a pneumonia são causadas por muitos micro-organismos que não sejam serotipos de *Streptococcus pneumoniae* representados pela vacina, espera-se que a proteção geral contra essas doenças seja limitada e substancialmente menor que a proteção contra doença invasiva causada pelos serotipos da vacina e o serotipo 19A (consulte a seção "Propriedades farmacológicas").
Em ensaios clínicos, o *Synflorix™* obteve resposta imune para todos os dez serotipos incluídos na vacina, mas a magnitude das respostas variou entre os serotipos. A resposta imune funcional aos serotipos 1 e 5 foi menor em magnitude do que a resposta contra todos os outros serotipos da vacina. Não se sabe se essa resposta imune funcional menor contra os serotipos 1 e 5 resultará em menor eficácia de proteção contra doença invasiva, pneumonia ou otite média causada por esses serotipos (consulte a seção "Propriedades farmacológicas").
O *Synflorix™* é indicado para uso em crianças de 6 semanas a 5 anos de idade. Crianças devem receber o regime de dose de *Synflorix™* que é apropriado à sua idade no momento do início da série de vacinação (consulte a seção "Programa de vacinação"). Dados de segurança e de imunogenicidade ainda não estão disponíveis em crianças acima de 5 anos de idade.
Crianças com resposta imune deficiente, seja devido ao uso de terapia com imunossupressores, defeito genético, infecção com HIV, exposição pré-natal à terapia antirretroviral ou ao HIV, ou outras causas, poderão ter redução da resposta de produção de anticorpos após a imunização.
Dados de segurança e imunogenicidade estão disponíveis para lactentes infectados pelo HIV (assintomáticos ou com sintomas leves, de acordo com a classificação da OMS), lactentes HIV-negativos nascidos de mães HIV-positivas e crianças com anemia falciforme (consulte as seções "Reações adversas" e "Propriedades farmacológicas"). Os dados de segurança e imunogenicidade para o *Synflorix™* não estão disponíveis para indivíduos em outros grupos imunocomprometidos específicos, e a vacinação deve ser considerada individualmente (veja a seção "Programa de vacinação").
Crianças menores de 2 anos de idade devem receber as séries de vacinação de *Synflorix™* apropriadas para a idade (consulte a seção "Programa de vacinação"). O uso de vacinas pneumocócicas conjugadas não substitui o uso de vacinas pneumocócicas polissacarídicas de tipo 23 valente em crianças ≥ 2 anos de idade com alterações (tal como anemia falciforme, asplenia, infecção por HIV, doença crônica ou com outras doenças que causam imunocomprometimento) colocando-os em maior risco para doença invasiva devido a *Streptococcus pneumoniae*. Quando for recomendado, crianças em risco com ≥ 24 meses de idade e já primo-vacinadas com *Synflorix™* devem receber vacina pneumocócica polissacarídica do tipo 23 valente. O intervalo entre a vacina pneumocócica conjugada (*Synflorix™*) e a vacina pneumocócica polissacarídica do tipo 23 valente não deve ser menor que 8 semanas. Não há dados disponíveis para indicar se a administração de vacina pneumocócica polissacarídica em crianças primo-vacinadas com *Synflorix™* pode resultar em hiper-responsividade a futuras doses da vacina pneumocócica polissacarídica ou da vacina pneumocócica conjugada.
A administração profilática de antipiréticos antes ou imediatamente depois da administração das vacinas pode diminuir a incidência e a intensidade das reações febris pós-vacinação. Os dados clínicos gerados com paracetamol e ibuprofeno sugerem que o uso profilático de paracetamol pode reduzir a taxa de febre, enquanto o uso profilático de ibuprofeno mostrou um efeito limitado na redução da taxa de febre. Os dados clínicos sugerem que o paracetamol pode reduzir a resposta imune ao *Synflorix™*. Entretanto, a relevância clínica dessa observação é desconhecida.
O uso de produtos medicinais antipiréticos profiláticos é recomendado:
- para todas as crianças que recebem *Synflorix™* simultaneamente com vacinas contendo tosse convulsa de célula completa de maior taxa de reações febris (consulte a seção "Reações adversas").
- para crianças com distúrbios convulsivos e com histórico anterior de convulsões febris.

O tratamento com antipirético deve ser iniciado de acordo com as diretrizes de tratamento local.
Gravidez e aleitamento
Como *Synflorix™* não se destina a ser utilizado em adultos, não existem dados suficientes sobre a utilização durante a gravidez ou aleitamento no ser humano e não foram realizados estudos de reprodução em animais.
Sobredosagem
Nenhum caso de overdose foi relatado.
Dados de segurança pré-clínica
Estudos com formulação de vacina com dose 11 valente representativos de *Synflorix™* não revelou nenhum perigo especial para humanos com base nos estudos convencionais de toxicidade de dose única e repetida de farmacologia de segurança.
Incompatibilidades
Na ausência de estudos de compatibilidade, este medicamento não deve ser misturado com outros medicamentos.
PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS
Para esta secção, consulte a Ficha de Dados Técnicos da OMS.
ARMAZENAGEM
O prazo de validade da vacina está indicado no rótulo e na embalagem.
Conservar no frigorífico (2°C – 8°C).
Não congelar.
Conservar na embalagem de origem para proteger da luz.
Para condições de armazenagem após abrir, consulte a secção Administração.
APRESENTAÇÃO
O *Synflorix™* é apresentado em um frasco (vidro tipo I) para 4 doses (2 ml) com uma tampa (borracha de butilo). Embalagem com 100.
Monitor do Frasco para Injetáveis da Vacina (ver o pictograma do MFIV no fim do folheto)
O Monitor do Frasco para Injetáveis da Vacina (MFIV) faz parte do rótulo do frasco de 4 doses utilizado para todos os lotes de *Synflorix™* fornecidos pela GlaxoSmithKline Biologicals. O ponto com cor que aparece no rótulo do frasco de 4 doses é um MFIV. Este é um ponto sensível a temperatura-período de tempo que fornece a indicação do calor cumulativo a que o frasco para injeções/ou foi exposto. Alerta o utilizador final quando existe a possibilidade de exposição ao calor ter degradado a vacina para além do nível aceitável.
A interpretação do MFIV é simples. Concentre-se sobre um quadrado central. À cor do quadrado muda progressivamente. Enquanto a cor do quadrado for mais clara do que a cor do anel, a vacina pode ser utilizada. Logo que a cor do quadrado central fiver a mesma cor que o anel ou uma cor mais escura do que o anel, o frasco para injeções/ou deve ser eliminado.
É absolutamente essencial assegurar que as condições de conservação acima especificadas (em especial a cadeia de frio) sejam observadas. A GlaxoSmithKline Biologicals não assume qualquer responsabilidade se *Synflorix™* for tiver sido conservado de acordo com as instruções de conservação.
Para mais informações queira contactar o fabricante.
Synflorix é uma marca comercial do grupo de empresas da GSK.

DESCRIÇÃO
Synflorix™ - suspensão para injeção
Vacina antipneumocócica polissacarídica conjugada (adsorvida)
Uma dose (0,5 ml) contém 1 micrograma de polissacarídio dos serotipos 1[1,2], 5[1,2], 6B[1,2], 7F[1,2], 9V[1,2], 14[1,2] e 23F[1,2], e 3 microgramas de polissacarídio dos serotipos 4[1,2], 18C[1,2] e 19F[1,2].

[1] adsorvido em fosfato de alumínio	0,5 miligramas de Al^{3+}
[2] conjugado com a proteína D (derivada do *Haemophilus influenzae* não tipável) como proteína portadora	9-16 microgramas
[2] conjugado com a proteína portadora do toxóide tetânico	5-10 microgramas
[2] conjugado com a proteína portadora do toxóide diftérico	3-6 microgramas

Excipientes: cloreto de sódio, 2-fenoxietanol, água para injetáveis
ADMINISTRAÇÃO
O frasco de *Synflorix™* deve ser administrado como injeção intramuscular. Os locais preferidos são a região ântero-lateral da coxa nos lactentes ou o músculo deltóide do braço em crianças pequenas (possuir também as seções Programa de Imunização e Precauções).
O Synflorix™ é uma suspensão branca turva. É possível observar um depósito fino branco com um sobrenadante incolor transparente após o armazenamento do frasco para injeções/ou que, no entanto, não constitui um sinal de deterioração.
O conteúdo do frasco para injeções/ou deve ser inspecionado visualmente antes e depois da agitação para detecção de partículas estranhas e/ou de um aspecto físico anormal antes de administrar.
Caso sejam observadas, a vacina deve ser eliminada.
Deve-se permitir que a vacina alcance a temperatura ambiente antes de uso.
A vacina deve ser bem agitada antes da utilização.
Depois de aberto, o frasco multidose deve ser mantido em um refrigerador (2 °C - 8 °C).
- O frasco de 4 doses de *Synflorix™*, de qual uma ou mais doses de vacina foram removidas durante uma sessão de imunização, pode ser usado em sessões de imunização subsequentes, por no máximo 28 dias, desde que todas as condições a seguir sejam atendidas (conforme descrito na declaração de política da OMS. O uso de frascos multidose abertos em sessões de imunização subsequentes. OMS/WAB/00.09):
- O frasco está dentro da validade.
- As vacinas estão armazenadas de acordo com as condições apropriadas de cadeia de frio;
- O septo do frasco da vacina não foi submerso em água;
- Todas as doses foram retiradas com a utilização da técnica asséptica;
- O Monitor de Frasco para Injetáveis da Vacina (MFIV), se presente, não está no ponto de descarte.

Os produtos não utilizados ou os resíduos devem ser eliminados de acordo com as exigências locais.

PROGRAMA DE VACINAÇÃO
Imunização ativa contra a doença invasiva, pneumonia e otite média aguda causadas pelo *Streptococcus pneumoniae* em lactentes e crianças a partir das 6 semanas até aos 5 anos de idade. Consulte as seções "Precauções" e "Propriedades farmacológicas" para informação sobre proteção contra serotipos pneumocócicos específicos.
O uso do *Synflorix™* deve ser determinado com base em recomendações oficiais levando em consideração o impacto em doenças pneumocócicas em diferentes faixas etárias, bem como a variabilidade da epidemiologia em diferentes áreas geográficas.
Programa de vacinação
Lactentes entre as 6 semanas e os 6 meses de idade
Esquema de imunização primária de três doses
O esquema de imunização recomendado que garante proteção otimizada consiste em quatro doses de 0,5 ml cada uma. O esquema de imunização primária infantil consiste em três doses, sendo a primeira geralmente administrada aos 2 meses e com intervalo de pelo menos 1 mês entre as doses. A primeira dose pode ser administrada em bebês com idade mínima de 4 semanas.
Recomenda-se uma quarta dose de reforço pelo menos 6 meses após a última dose primária e preferencialmente, podendo ser administrada do 9 meses em diante (de preferência entre 12 e 15 meses de idade) (ver as seções "Precauções" e "Propriedades farmacológicas").
Esquema de imunização primária de duas doses
Alternativamente, quando a *Synflorix™* é dado como parte de um programa de imunização infantil rotineiro, pode-se usar um esquema de três doses de 0,5 ml cada uma. A primeira dose pode ser administrada já às 6 semanas de idade, com a segunda dose administrada dois meses depois. Recomenda-se uma (terceira) dose de reforço pelo menos 6 meses após a administração da última dose primária, podendo ser administrada dos 9 meses em diante (de preferência entre 12 e 15 meses de idade) (ver a seção Propriedades farmacológicas).
Lactentes e crianças não vacinados a 7 meses de idade:
- lactentes com idade entre 7 e 11 meses: O esquema de vacinação consiste em duas doses primárias de 0,5 ml administradas com um intervalo de pelo menos 1 mês entre as doses. Recomenda-se uma (terceira) dose de reforço no segundo ano de vida com um intervalo de pelo menos 2 meses após a última dose primária.
- crianças com idade entre 12 meses e 5 anos: O esquema de vacinação consiste em duas doses de 0,5 ml administradas com um intervalo de pelo menos 2 meses entre as doses.

As recomendações oficiais devem ser tidas em consideração quando se efetua a imunização com *Synflorix™* (para lactentes prematuros, ver as seções Reações adversas e Propriedades farmacológicas).
Recomenda-se que as crianças que receberam uma primeira dose de *Synflorix™* completem todo o ciclo de vacinação com *Synflorix™*.
Populações especiais
Não individuais que tiveram condições subjacentes que os predispõem a doença pneumocócica invasiva (como anemia falciforme ou infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV)), o *Synflorix™* pode ser administrado (veja as seções "Precauções especiais de utilização" e "Propriedades farmacológicas"):
- em lactentes, conforme descrito em "Esquema de imunização primária de três doses", acima.
- em crianças não vacinadas a 7 meses de idade e menores de 2 anos de idade, conforme descrito em "Lactent